

Ihre Zukunft in der Pflanze.®

Mehrzeilige Wintergerste

WINNIE

Standorteignung und Bestandesaufbau

WINNIE ist für alle Standorte geeignet, auch Trockenstandorte.

Aussaat

Die Aussaat erfolgt zum ortsüblichen Termin von Mitte September bis Mitte Oktober. Eine ausreichende Vorwinterentwicklung sollte gewährleistet sein.

Aussaatstärken:

Früh 220–240 keimf. Körner/m²

Mittel 250–280 keimf. Körner/m²

Spät 290–340 keimf. Körner/m²

Düngung

Die N-Düngung erfolgt in der ortsüblichen Höhe. Besonderes Augenmerk ist auf die Erhaltung und Förderung der Kornzahl je Ähre zu richten. Weiterhin ist es wichtig die Bestandesdichte zu fördern und das Tausendkorngewicht zu erhalten.

Fungizide

Aufgrund der guten Resistenzeigenschaften genügt normalerweise eine Fungizidanwendung in EC 39 – 49. Bei hohem Infektionsdruck kann eine Doppelbehandlung die Ertragsicherheit fördern.

Wachstumsregler

WINNIE verfügt bei mittlerer Pflanzenlänge über eine gute Standfestigkeit und Strohstabilität. Eine einmalige Behandlung mit einer an die Ertragserwartung und die Bestandesentwicklung angepassten Aufwandmenge wird in den meisten Fällen ausreichend sein